

ПЕСТРУ́ШКИ

Авторы: Н. А. Щипанов



Обыкновенная пеструшка.

Рис. Е. Н. Федорченко

ПЕСТРУ́ШКИ, термин, используемый в рус. названиях трёх родов грызунов сем. хомяковых: П. обыкновенные с единственным одноимённым видом (*Lagurus lagurus*) распространены в равнинных и горных степях Евразии, от Приднепровья до Тувы и Тянь-Шаня; П. жёлтые с двумя видами (*Eolagurus luteus* и *E. przewalskii*) населяют крайний восток Казахстана, Сев.-Вост. Китай, Монголию; П. американские с единственным видом (*Lemmys curtatus*) обитают в степях и полупустынях запада Сев. Америки. В России распространена П. обыкновенная. Внешне она похожа на короткохвостых полёвок. Тело вальковатое, конечности короткие, уши едва выступают над мехом головы. Хвост короткий, с редкими волосами. Подошвы лап покрыты

шерстью. Длина тела до 12 см, хвоста до 2 см. Окраска спины однотонная, буровато-охристая, брюхо светлее; вдоль спины проходит тёмная полоса. Населяет степи, избегая кустарниковые заросли, селится на пашнях, залежах, выгонах, по обочинам дорог. Роет сложные норы или использует норы др. грызунов. Активны в любое время суток, но б. ч. времени проводят под землёй; на поверхность выходят в сумерках или ночью. При высокой численности совершает наземные перекочёвки днём. Питается злаками и полынями, поедает луковицы и корни, включает в рацион насекомых. Может приносить до 6 помётов в год, по 5–6 детёнышей в помёте. Характерны резкие колебания численности: вспышки размножения сменяются глубокими депрессиями. В годы высокой численности вредит посевам и пастбищам. Имеет второстепенное значение как распространитель туляремии. В природных местообитаниях является основой питания лисицы, корсака, мелких куных, хищных птиц. Согласно Красному списку МСОП, состояние вида опасений не вызывает.

П. называют также норвежского лемминга (*Lemmus lemmus*).