

ПІТТОВЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот



Черноголовая питта.

Фото Dick Daniels

ПІТТОВЫЕ (Pittidae), семейство птиц подотряда (или инфраотряда) кричащих воробьиных отр. воробьинообразных. Родственны рогоклювым (Eurylaimidae) и мадагаскарским питтовым (Philepittidae). Один род (*Pitta*), 30–34 вида, населяющих тропики Юж. и Юго-Вост. Азии, Африки (2 вида) и Сев. Австралии (3 вида). Длина 15–29 см; масса от 64,5 (40–82) г у чёрноголовой питты (*P. sordida*) до 166–206 г у питты-великана (*P. maxima*). Самцы обычно несколько крупнее самок. Птицы плотного сложения, с округлым телом, очень коротким хвостом, длинными, сильными ногами и вертикальной посадкой. Клюв высокий, расширенный у основания, слегка загнут книзу; глаза крупные; шея короткая; крылья широкие, закруглённые; цевка и пальцы длинные, когти слабо изогнуты. Одни из наиболее ярко

окрашенных птиц, в оперении которых преобладают, кроме белого и чёрного, насыщенные зелёные, голубые, синие, красные, жёлтые и коричневые цвета. У многих П. особенно ярко окрашены низ, поясница и надхвостье; на крыльях нередко расположены белые пятна. У 9 видов самки менее яркие, чем самцы; молодых особей отличает тусклая и более пятнистая окраска. Предпочитают дождевые тропич. леса, селятся также в густых кустарниках, бамбуковых и мангровых зарослях, в горах – до выс. 3000 м. Избирают участки по берегам ручьёв и рек с обильной лиственной подстилкой. Преим. оседлы, лишь 4 вида совершают сезонные ночные перелёты. Скрытные птицы, более активные ранним утром и поздним вечером; кормятся на земле, передвигаясь широкими прыжками; ночуют на деревьях. В рационе преобладают беспозвоночные, гл. обр. членистоногие (особенно насекомые, пауки, многоножки, наземные крабы), земляные черви и улитки, реже поедают мелких лягушек, ящериц, змей, также фрукты и семена. Птенцам часто приносят червей. Добычу обычно ловят в лесной подстилке, разгребая её клювом. Моногамы; строго защищают гнездовые и кормовые участки. Для самцов (часто также самок) характерны короткие, редко протяжные одно- или двусложные крики и свисты; некоторые кричат также лунными ночами, известны и «хоры» нескольких соседних пар. Шаровидное гнездо с боковым входом строят обе птицы из веточек, стеблей, корешков и листьев; нередко маскируют его мхом и листьями. Постройку укрывают в нишах на земле среди густой растительности, корней деревьев, на пнях, в дуплах, обрывах, расщелинах скал или в кронах, среди ветвей на выс. до 2 м. Кладку из 2–7 (обычно 3–5) яиц насиживают 14–18 дней оба партнёра; птенцы покидают гнездо через 15–17 дней после вылупления, родители кормят их ещё ок. 10 дней. Нередко в сезоне 2 кладки. Вырубка лесов, пожары, охота и отлов для содержания в неволе приводят к снижению численности многих П. В Красную книгу МСОП включены 9 видов, из них питта Гёрни (*P. gurneyi*) находится в угрожаемом состоянии, 8 видов уязвимы.