



# ПОЛУОБЕЗЬЯНЫ

Авторы: А. О. Аверьянов

---

ПОЛУОБЕЗЬЯНЫ, устар. название подотряда мокроносых приматов (Strepsirrhini) отр. приматов, противопоставляемого подотряду сухоносых приматов (Haplorhini; долгопяты и обезьяны). В старых классификациях П. включали также тупай, выделяемых ныне в отд. отряд Scandentia. Мокроносые приматы разделяются на инфраотряды адаписообразные (Adapiformes), лемуриобразные (Lemuriformes) и лориобразные (Lorisiformes). Адаписообразные включают 3 вымершие семейства: Notharctidae (эоцен Сев. Америки и Европы), Adapidae (эоцен Европы) и Sivaladapidae (миоцен Юж. Азии). Лемуриобразные включают 5 совр. семейств и 3 семейства, вымершие в историч. время; все – обитатели Мадагаскара, за исключением *Bugtilemur* (сем. мышинных лемуров, *Cheirogaleidae*) из раннего олигоцена Пакистана. Лориобразные распространены в Африке и Юго-Вост. Азии и включают 2 семейства: лориевые (*Lorisidae*) и галаговые (*Galagidae*). Нижние резцы и клыки у совр. П. (кроме руконожки, *Daubentonia*) очень тонкие и длинные; образуют своеобразную зубную расчёску, используемую для гигиенич. процедур (груминга).