


ПРОФИЛИРÓВКА ЛИЦА́

Авторы: И. В. Перевозчиков



Профилirовка лица: 1 – вертикальная (а – прогнатная, б – ортогнатная); 2 – горизонтальная (а – слабая, б – сильная) (по Е. Н. Хрисанфовой и И. В. Перевозчикову).

ПРОФИЛИРÓВКА ЛИЦА́, степень выступания лица в горизонтальной (горизонтальная П. л.) и вертикальной (вертикальная П. л.) плоскостях. Для горизонтальной П. л. оценивается мера клиногнатности/уплощённости лица (отношение в горизонтальных сечениях высот точек над линией, соединяющей латеральные точки), а также степень уплощённости переносья (наклон боковых стенок носа к плоскости лица). Для вертикальной П. л. различаются сильное (прогнатизм) или слабое (ортогнатизм) выступание лица в целом, а также его носовой и альвеолярной частей – мера удаления точек сечения лица в саггитальной плоскости, проходящей через верхушечную точку и назион (см. рис. к ст. [Кефалометрия](#)), от вертикальной плоскости, проходящей по касательной через глабеллу (наиболее выступающую переднюю точку лобной кости).

При исследовании совр. населения оценка П. л. производится визуально (так, горизонтальная П. л. определяется на горизонтальном сечении через

скуловые дуги или как мера выступания скуловых дуг за линию профиля при повороте головы в $3/4$;

уплощённость оценивается по трёхбалльной шкале). На черепах П. л. выражают в виде углов, измеряемых с помощью приборов или вычисляемых через тригонометрич. функции.

П. л. имеет важное диагностич. значение при расовой классификации. Так, монголоидные расы отличаются уплощённым лицом, негроидные – прогнатизмом.