

# ПУХО́ВКОВЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот



Фото Vince Smith

Пуховковые. Белолобая монашенка.

ПУХО́ВКОВЫЕ, ленивковые (Bucconidae), семейство птиц отр. дятлообразных. Вместе с якамаровыми (Galbulidae) П. выделяют в подотр. Galbulae (иногда в отдельный отр. якамарообразных, Galbuliformes). Длина 13–29 см, масса от 14,5–19 г (серощёкая ноннула, *Nonnula frontalis*) до 90,5–122 г (белолобая монашенка, *Monasa morphoeus*). Телосложение плотное; голова и глаза крупные, шея короткая; клюв обычно несколько короче головы, массивный, конический, с широким основанием и выпуклым коньком, крючковатый. Ноздри прикрыты жёсткими щетинками, хорошо развитыми также в углах рта. Ноги короткие. Крылья закруглённые, широкие, особенно у ласточкокрылой пуховки (*Chelidoptera tenebrosa*); хвост средней длины или короткий, закруглённый, реже ступенчатый или прямой. Оперение рыхлое, пушистое (отсюда назв.); его окраска обычно пёстрая или расчленяющая, с преобладанием бурых, коричневых, охристых, белых и чёрных тонов, иногда в сочетании с голубовато-серыми или красноватыми; нередко узкие светлые и тёмные

полосы образуют поперечный или продольный рисунок. Самки обычно похожи на самцов, молодые менее яркие, некоторые отличаются также окраской клюва и радужной оболочкой глаз. 12 родов, ок. 35 видов, в т. ч. пуховки-малакоптилы (*Malacoptila*, 7 видов), ноннулы (6 видов), нотархи (*Notharchus*, 6 видов), нисталусы (*Nystalus*) и монашенки (по 4 вида). П. распространены гл. обр. в тропиках Центр. (8 видов) и Юж. Америки, большинство в равнинных дождевых лесах всех типов и саваннах; часть видов обитает в горных лесах, в Сев. Андах до выс. 2900 м (белолицая ноннула, *Naraloptila castanea*). Селятся преим. по берегам рек и озёр, на лесных опушках, вблизи ветровальных «окон» или вырубок; некоторые также во вторичных лесах, особенно с отд. высокими деревьями, на пастбищах, плантациях кофе и какао. Ведут, как правило, оседлый образ жизни. Питаются гл. обр. насекомыми (в т. ч. термитами, крупными прямокрылыми, палочниками, богомолами, жуками, бражниками), пауками, многоножками, поедают также крабов, мелких лягушек, ящериц, змей, иногда птенцов, грызунов, семена и сочные плоды (напр., омелы). Характерна ловля добычи (особенно летающей) в коротком броске с присады; в связи с малой подвижностью птиц, высматривающих добычу на присаде, их ещё называют «ленивками» (отсюда второе назв.). Гнёзда – в укрытиях, преим. в твёрдых термитниках, расположенных на стволах деревьев (на выс. до 25 м), или в норах (длина 0,4–2 м), вырытых самими партнёрами обычно в обрывах и насыпях с рыхлым грунтом, а также в дуплах. Гнездовую камеру выстилают сухими листьями или травой. В кладке 2–3 яйца (редко 1 или 4), насиживают обе птицы 15–18 дней. Птенцы вылупляются слепыми и голыми; в их выкармливании кроме родителей иногда участвуют 1–2 помощника; у мелких видов молодые особи покидают гнёзда в возрасте 20, у крупных – 37–38 дней. В сезон бывает один, очень редко два выводака.