

САПСА́Н

Авторы: Е. А. Коблик



Сокол-сапсан.

Фото Tarique Sani

САПСА́Н, сокол-сапсан (*Falco peregrinus*), птица рода соколов. Длина 34–50 см, масса самцов 550–800 г, самок 900–1500 г, размах крыльев 80–120 см. Сложение плотное, хвост относительно короткий, крылья заострённые. Верх тёмно-сизый, низ от белого до розоватого и охристого с редкими тёмными пестринами на груди и частыми поперечными полосами на брюхе и боках. Крылья и хвост снизу в частых полосках. Голова чёрная, характерен резкий чёрный ус, контрастирующий со светлыми щекой и горлом. Область распространения охватывает почти весь земной шар (отсутствует в тропич. лесах Юж. Америки и Центр. Африки, на некоторых островах и в Антарктиде). Из сев. частей ареала на зиму улетает в тропики и субтропики. Выделяют до 18 подвидов. С. – специализир. возд. охотник на птиц, пикируя на добычу, развивает скорость до 280 км/ч, изредка охотится на мелких млекопитающих. Предпочитает мозаичные

ландшафты, гнездится в постройках др. птиц, на уступах скал, вершинах тундровых и степных холмов, на гор. зданиях. Образует постоянные пары, охраняет гнездовую территорию. Гнездованию предшествует возд. ток с пронзительным клёкотом. В кладке 1–4 яйца, насиживание 32 дня, выкармливание 35–47 дней. Численность С. за последнее столетие уменьшилась в 2–4 раза, что связано с накоплением ядохимикатов в организме, фактором беспокойства, браконьерским отловом взрослых и изъятием птенцов для использования в качестве ловчих птиц. На б. ч. территории России встречается спорадично, сплошной ареал и относительно высокая плотность гнездования сохранились в таёжной и тундровой зонах; в Европ. части России насчитывается не более 700 пар. Внесён в Красные книги МСОП и РФ. С. разводят в питомниках, успешно реинтродуцируют в дикую природу.