

СЕЛЬДЕОБРА́ЗНЫЕ

Авторы: А. Н. Котляр



Сельдеобразные. Дораб.

Рис. Е. Н. Федорченко

СЕЛЬДЕОБРА́ЗНЫЕ (Clupeiformes), отряд лучепёрых рыб. Длина тела 5–70 см (дораб, *Chirocentrus dorab*, достигает длины 3,7 м), масса от нескольких граммов до 4 кг. Тело обычно сжато с боков. Чешуя циклоидная.

Плавники без колючек. Спинной плавник один, расположен в середине спины или немного сдвинут к хвостовому отделу, хвостовой –

гомоцеркальный; грудные плавники расположены ближе к брюху,

брюшные – в средней части брюха. Нет зубов на парасфеноиде (кость дна черепа). Открытопузырные; отростки

плавательного пузыря размещаются в полости черепа (в слуховых капсулах). 5 семейств: анчоусовые

(Engraulidae), дентицепсовые (Denticipitidae; с единственным видом – *Denticeps clupeoides*), дорабовые, или

зубастые, сельди (*Chirocentridae*; 2 вида), пристигастеровые (*Pristigasteridae*), [сельдевые](#); в водах России 21 вид.

С. – стайные пелагич. рыбы, многие – планктофаги. Обитают обычно в морских водах от тропич. до умеренных широт; некоторые пресноводные или мигрируют в реки на нерест. Имеют важнейшее промысловое значение.

Литература

Лит.: Промысловые рыбы России. М., 2006. Т. 1; Парин Н. В., Евсеенко С. А., Васильева Е. Д. Рыбы морей России: Аннотированный каталог. М., 2014.