

СКОРПИО́НОВЫЕ МУ́ХИ

Авторы: Г. В. Фарафонова



Фото Karsten Dörre

Скорпионница обыкновенная
(*Panorpa vulgaris*).

СКОРПИО́НОВЫЕ МУ́ХИ, скорпионницы (Mecoptera), отряд насекомых. Тело (2,5–20 мм в длину) чёрное или тёмно-бурое. Голова вытянута в виде направленного вниз клюва (рострума). На его вершине – маленький грызущий ротовой аппарат. Крылья прозрачные или с тёмными пятнами. У некоторых самцов конец брюшка вздут, загнут вверх и вперёд, напоминая «хвост» скорпиона (отсюда назв.). Ок. 500 видов, в России ок. 25 видов. Превращение полное. Личинки малоподвижны, живут в лесной подстилке, почве, гниющих пнях, во мху. Питаются органич. остатками. Имаго – в травяном покрове и кустарниках. Летают плохо. Виды из сем. настоящие скорпионницы (Panorpidae) выедают внутр. органы мёртвых насекомых, собирают пыльцу; представители сем. комаровки (Bittacidae) охотятся на

мелких насекомых. Бескрылые крошечные мухи сем. ледничники (Boreidae) активны в осенне-зимнее время, нередко на снегу во время оттепелей (отсюда назв.), их личинки и имаго питаются ризоидами мхов. Древние С. м. являются предками [ручейников](#), [двукрылых](#) и [блех](#).