



# СОКОЛООБРА́ЗНЫЕ

Авторы: Е. А. Коблик

СОКОЛООБРА́ЗНЫЕ, дневные хищные птицы (Falconiformes), отряд птиц. Известны с раннего кайнозоя. Длина от 15 до 150 см, размах крыльев от 35 до 320 см, масса от 35 г до 15 кг. Самки, как правило, крупнее самцов.

Характерны мускулистый корпус, хорошо развитые крылья, крупные, направленные вперёд глаза, загнутый клюв, сильные лапы с крючковатыми когтями. Жертв отслеживают при помощи острого зрения, хватают и убивают преим. лапами, клюв используется гл. обр. для разделки корма. Традиционно отряд включает 5 семейств

([ястребиные](#), скопиные, птицы-секретари, [американские грифы](#), [соколиные](#)), ок. 80 совр. родов и 300 видов (в России отмечены представители 3 семейств, 18 родов и 48 видов). Однако, исходя из совр. молекулярно-генетич.

данных, С. – сборная группа; первые 3 семейства, вероятно, составляют отряд ястребообразных (Accipitriformes), а американских грифов следует относить к отряду аистообразных; т. о., в составе отряда С. остаются лишь соколиные.

Распространены всесветно, кроме Антарктиды и некоторых островов. Поедают животных – от насекомых, моллюсков и рыбы до крупных птиц и млекопитающих среднего размера, в виде исключения – плоды.

Есть специализир. падальщики. Моногамы, обычно образуют постоянные пары. Птенцы вылупляются зрячими, покрытыми густым пухом, но долго нуждаются в обогреве, выкармливании и защите. Мн. совр. виды находятся на грани исчезновения, нуждаются в охране.