



# ТАЙМЫ́Р

ТАЙМЫ́Р (Таймырский полуостров), один из самых северных полуостровов Евразии, в России, в Красноярском крае (Таймырский Долгано-Ненецкий р-н). Расположен за Сев. полярным кругом, между Енисейским зал. Карского м. и Хатангским зал. моря Лаптевых. Сев. окончание – мыс *Челюскин*. Длина ок. 1000 км, ширина более 500 км. Пл. ок. 400 тыс. км<sup>2</sup>. Побережье сильно изрезано: заливы Пясинский, Таймырский, Толля, Фаддея и более мелкие. В рельефе выделяются: на севере – узкая полоса низменной равнины вдоль побережья Карского м., в центре – *Бырранга горы* (выс. до 1125 м), на юге – *Северо-Сибирская низменность*. Расположен в юж. части Таймыро-Североземельской складчатой системы, сев. зона которой сложена метаморфизов. терригенными породами верхнего рифея, прорванными пермскими гранитоидами, и надвинута к югу. Центр. зона имеет сложное складчато-надвиговое строение; встречаются надвиговые пластины островодужных вулканитов и *офиолитов* рифея, докембрийских кристаллич. пород, вендско-кембрийских обломочных отложений, палеозойских осадков. Юж. зона образована карбонатными и терригенными породами палеозоя, угленосной толщей перми, пермско-триасовыми траппами и триасово-юрскими терригенными отложениями, смятыми в складки и нарушенными надвигами в конце триаса – юре – начале мела. Месторождения углей (Таймырский бассейн), у побережья – мор. россыпи золота. Т. – один из самых холодных районов Крайнего Севера – находится в арктич. и субарктич. климатич. поясах, что определяет суровость местного климата, характеризующегося холодной продолжительной (до 10 мес) зимой (ср. темп-ра января –30 °С; абсолютный минимум темп-ры –62 °С) и коротким прохладным летом (ср. темп-ра июля от 1,5 °С на севере до 13 °С на юге). Постоянные сильные ветры; зимой пурга (до нескольких недель). Ежегодно выпадает от 200 мм (на севере) до 400 мм (на юге) осадков. Повсеместны многолетняя мерзлота, ископаемые льды. В горах ледники (общей пл. св. 50 км<sup>2</sup>). Крупнейшие реки: *Пясина*, Верхняя и Нижняя Таймыра, *Хатанга*. Среди крупнейших озёр – *Таймыр*, Портнягино, Лабаз. Много термокарстовых озёр и болот. Ландшафты арктич. пустыни на арктич. почвах сменяются в центр. части ландшафтами моховой (осоковой, пушицевой) и кустарничковой тундры на тундровых и глеевых почвах; на юге – лесотундра (т. н. криволесье) из ольховника и березняка с огромными площадями ягеля. Развиты оленеводство, охота. Создан *Таймырский заповедник*; в пределах Т. – участки *Большого Арктического заповедника*.

Первое географич. исследование и картографирование Т. сделал в 1739–41 Х. П. *Лангее*.

## Литература

Лит.: Трифонов Е. В. Таймыр: Региональная география. Норильск, 1999; он же. Таймыр: Физическая география. Норильск, 2003.