



ТУРПА́НЫ

Авторы: В. М. Лоскот



Фото В. В. Климова
Обыкновенный турпан.

ТУРПА́НЫ (*Melanitta*), род крупных нырковых уток отр. гусеобразных. 5 видов: синьга (*M. nigra*), американская синьга (*M. americana*), пестроносый (*M. perspicillata*), обыкновенный (*M. fusca*) и горбоносый (*M. deglandi*) турпаны. Длина 43–58 см, масса 0,7–2,1 кг; самки мельче самцов. Клюв широкий, вздутый у основания; тело уплощённое; хвост короткий, закруглённый; полёт тяжёлый. Самцы чёрные; у обыкновенного и горбоносого Т. белое «зеркальце» на крыле. Самки коричневатого или серовато-бурые. Гнездятся на берегах водоёмов и болотах в зоне тундры и бореальных лесов сев. Голарктики. Зимуют преим. на мелководных участках побережий Тихого и Атлантического океанов. Прекрасно плавают

и ныряют на глубину до 40 м. Поедают моллюсков, ракообразных, иглокожих, многощетинковых червей, насекомых и мелких рыб, семена и вегетативные части водных растений. Селятся отд. парами или рассеянными группами. Самка насиживает в гнездовой ямке с растит. выстилкой кладку обычно из 6–9 яиц. Объекты охоты.