

ТУКА́НОВЫЕ

Авторы: Е. А. Коблик



Фото Fernando Flores / flickr.com

Кювьеров тукан (*Ramphastos
cuvieri*).

ТУКА́НОВЫЕ, туканы (*Ramphastidae*), семейство птиц отряда дятлообразных. Длина 30–60 см, масса 100–320 г. Голова большая, крылья закруглённые, ноги короткие с цепкими пальцами, два из которых направлены назад. Характерен необычайно крупный, высокий, но лёгкий клюв, составляющий до трети общей длины. Окраска оперения и клюва яркая. Т. очень крикливы, голоса громкие, твякающие или квакающие. 6 родов, 40 совр. видов. Обитают в Зап. полушарии – от Юж. Мексики до Сев. Аргентины, отсутствуют на островах. Встречаются в лесах разного типа, на опушках, в лесистых саваннах, в горы поднимаются до выс. 4000 м. Большую часть времени держатся в кронах деревьев, ловко лазают и скачут по ветвям, по земле передвигаются неуклюже. Основа питания – плоды; поедают также беспозвоночных, яйца птиц и птенцов, древесных ящериц и лягушек. Общительны и подвижны, часто держатся группами. Ночуют и гнездятся в дуплах. Моногамы. В кладке 2–4 яйца, насиживают 2–3 нед. Птенцы покидают гнездо через 6–8 нед. В заботе о потомстве принимают участие все члены группы (обычно неполовозрелые родственники).