

ТУРА́КО

Авторы: Е. А. Коблик



Краснохохлый турако (*Touraco erythrolophus*).

Фото Anne White / flickr.com

ТУРА́КО, тураковые (*Musophagidae*), семейство древесных птиц, ранее включавшееся в отр. кукушкообразных; ныне родств. связи группы считаются неясными; возможно, это самостоятельный отряд, близкий к гаоцину или кукушкам. Длина 40–75 см, масса 200–1000 г. Ноги короткие, приспособлены к обхватыванию веток. Хвост удлинён, крылья закруглены. Голова небольшая с коротким высоким клювом. Окраска лесных видов яркая, сочетает зелёные, синие, жёлтые, пурпурные тона, характерен контрастный рисунок возле глаз. Саванны населяют скромно окрашенные Т. Для Т. характерно наличие на голове хохла из волосовидных перьев. Голос – ритмичное воркование или квохтанье. 5–6 родов, 22 совр. вида; распространены во влажных тропич. лесах и кустарниковых саваннах Африки. Прекрасно лазают и бегают по ветвям. Питаются плодами, цветками, побегами, почками. Старое назв. Т. «бананоеды» неудачно, поскольку бананы они не едят. Оседлы, обычно держатся небольшими стайками, вместе с мартышками и птицами-носорогами кочуют от одного плодоносящего дерева к другому. Моногамы. Гнездятся в развилках ветвей, в кладке 2 яйца, насиживают оба родителя. Птенцы покрыты коротким густым чёрным пухом более 50 дней. Численность снижается.