

ЦОКОРЫ

Авторы: Н. А. Щипанов



Рис. Е.Н. Федорченко

Обыкновенный цокор (*Myospalax myospalax*).

ЦОКОРЫ (*Myospalax*), род млекопитающих сем. слепышовых (*Spalacidae*) отр. грызунов. 2 подрода: *Eospalax* и *Myospalax*, которые иногда рассматривают как самостоят. роды. До недавнего времени Ц. входили как подсемейство в состав сем. хомяковых. Длина тела 16–27 см, хвоста 2–7 см. Тело вальковатое, шейный перехват незаметен. Глаза почти не видны, на конце носа – толстая ороговевшая кожа. Конечности короткие, приспособлены для рытья, пальцы с сильно развитыми когтями. Шерсть густая, мягкая. Окраска от почти белой до рыжей и розовато-тёмно-жёлтой. 3 вида подрода *Eospalax* распространены в Сев.-Вост. Китае, Монголии, Казахстане и Юж. Сибири. 3 вида (по др. системе, 5) подрода *Myospalax* встречаются на территории России. Населяют степные и лесостепные участки, горные луга с мягкой почвой и богатой травянистой растительностью. Ведут подземный образ жизни. Роют сложноустроенные норы до 40 (иногда до 100) м длиной и до 1,5 (зимовочные до 3) м глубиной. При рытье выбрасывают землю наружу, образуя характерные кучки. Зимой прокладывают ходы под снегом. Питаются преим. разл. подземными частями растений; делают запасы на зиму. В году 1 помёт, 3–10 детёнышей. В природных экосистемах Ц. – важный средообразующий фактор. Местами могут наносить существенный ущерб на огородах.