



ЧАПАКУ́РСКИЕ ЯЗЫ́КИ

Авторы: Д. В. Герасимов

ЧАПАКУ́РСКИЕ ЯЗЫ́КИ, семья [индейских языков](#) Юж. Америки. Распространены на западе Бразилии (штаты Рондония и Амазонас) и на северо-востоке Боливии. Общее число говорящих ок. 2 тыс. чел. (2010-е гг., оценка), б. ч. из которых — носители яз. уари.

Засвидетельствовано до 12 Ч. я., из которых 8 вымерли и 3 находятся на грани вымирания. Выделяются 3 группы. В наиболее обособленную тапакурскую группу входят вымершие языки тапакура (чапакура), китемока и напека (возможно, представляет собой диалект яз. китемока); в морейскую — вымерший тора, а также море (итене; ок. 10 говорящих) и куюби (коджубим; двое говорящих); в уарийскую — уари (оровари, пакаасновус; ок. 2 тыс. говорящих), оро вин (менее 10 говорящих), вымершие ваньям (павумва, мигеленьо, кабиши), урупа и жару (возможно, является диалектом яз. урупа). Место вымершего яз. рокорона (оротокона) в классификации семьи не определено. Кроме того, известны только по названиям ещё ок. 15 вымерших языков, которые, возможно, относились к Ч. я. Распад чапакурского [праязыка](#) с выделением языка-предка будущих тапакурских языков произошёл предположительно в 8–10 вв.

Внешние генетич. связи Ч. я. не установлены. Проверка гипотез об их родстве с араванскими языками (малочисленная семья в зап. части Амазонии) и [карибскими языками](#) затруднена из-за плохой изученности чапакурских языков.

[Вокализм](#) насчитывает 5 или 6 фонем. Особенность яз. уари — т. н. перекошенный вокализм: включает 5 гласных переднего ряда (из них 2 огублённых) при только одном гласном заднего ряда. [Консонантизм](#) значительно варьирует с точки зрения сложности (от 15–16 до 34 фонем). Характерны пре- и постглоттализированные смычные и сонанты. В языках уари и оро вин представлен крайне редкий звук: глухая апикально-дентальная смычка, за которой следует глухой губно-губной дрожащий вибрانت (напоминает по звучанию рус. идеофон «тпру!»). Ударение динамико-музыкальное, падает на последний слог, реже — на предпоследний.

Строение словоформы агглютинативное (см. [Агглютинация](#) в лингвистике) с элементами [фузии](#). Знаменательные части речи представлены глаголом и существительным; признаковые значения выражаются подклассом существительных. Падежи отсутствуют, местоименные энклитики (см. [Клитика](#)) [субъекта](#) и (определённого) прямого [объекта](#), выражающие также грамматич. значения времени и наклонения, следуют принципам [номинативного строя](#). Существительные делятся на 3 рода (муж., жен. и ср.), распределение по которым мотивировано семантически. Родовые формы различаются у личных и указательных местоимений, местоименных энклитик 3-го лица «безвременной» серии, показателей притяжательности на обладаемом.

Базовый [порядок слов](#) «глагол + прямое дополнение + подлежащее».

Первые контакты носителей яз. тапакура с европейцами имели место в 17 в., другие Ч. я. были обнаружены позднее (оро вин — только в 1963). Изучение Ч. я. начато в 1-й пол. 19 в. Окончательно были выделены в

языковую семью Ж.де Креки-Монфором (Франция) и П. [Риве](#) в 1913. От мн. Ч. я. сохранились только списки слов и/или немногочисл. краткие тексты. Лучше других изучены языки уари и море.

Литература

Лит.: Everett D. L., Kern B. Wari': The Pacaas Novos language of western Brazil. L.; N. Y., 1997; Angenot de Lima G. Description phonologique, grammaticale et lexicale du moré, langue amazonienne de Bolivie et du Brésil. Porto Velho, 2001; Birchall J. A look at the Rococona language // STUF: Sprachtypologie und Universalienforschung. 2013. Bd 66. № 3; Birchall J., Dunn M., Greenhill S. J. A combined comparative and phylogenetic analysis of the Chapacuran language family // International Journal of American Linguistics. 2016. Vol. 82. № 3.