

ХМЕЛЬ

Авторы: А. Л. Буданцев



Хмель обыкновенный.

ХМЕЛЬ (*Humulus*), род растений сем. коноплёвых. Многолетние травянистые или однолетние двудомные лианы до 10 м в длину. Стебли ребристые шероховатые. Листья супротивные, 3–7-пальчато-лопастные, реже цельные. Тычиночные (мужские) цветки собраны в пазушные метельчатые соцветия, пестичные (женские) цветки расположены по два в пазухах кроющих чешуй, образующих поникающие серёжковидные соцветия, разрастающиеся к плодоношению в соплодия («шишки»). Плод – орех. 2–3 вида. Распространены в Евразии, Америке, Австралии, Сев. Африке. В России 2 вида, произрастающих в сырых лесах, среди кустарников, на вырубках, опушках, у жилья. Х. обыкновенный (*H. lupulus*)

распространён повсеместно, за исключением сев. территорий, Х. лазящий (*H. scandens*) встречается на Дальнем Востоке. Соплодия Х. обыкновенного используются в пивоваренной пром-сти и медицине при изготовлении седативных и сердечно-сосудистых средств; в Китае масло плодов Х. лазящего применяется при произ-ве мыла. Виды Х. – декоративные растения.