

УША́НЫ

Авторы: С. В. Крускоп



Бурый ушан.

Фото С.В. Крускопа

УША́НЫ (*Plecotus*), род летучих мышей сем. кожановых. Ок. 20 видов, многие из которых выявлены недавно методами молекулярной генетики. Длина 4,5–7 см, масса 5–20 г. Тело короткое и широкое, голова большая. Крупные ноздри направлены вверх и окружены кожными валиками. Огромные ушные раковины (более половины длины тела) соприкасаются на лбу, в покое веерообразно складываются назад. Крылья широкие, с тупыми вершинами. Хвост полностью включён в межбедренную перепонку. Волосяной покров густой, мягкий; окраска от светло-песчаной до тёмно-бурой. Распространены от Скандинавии и Великобритании до Японии и Тайваня, а также на Канарских о-вах и северо-востоке Африки; в России 3

вида. Населяют разнообразные зоны от полупустынь до лиственных и таёжных лесов, в тропиках – горные леса и редколесья. Полёт манёвренный; охотятся как в воздухе, так и собирая добычу (насекомых) с разл. субстратов. Убежища – полости деревьев, пещеры и постройки человека. Живут одиночно или небольшими группами. Оседлы, зимуют в подземных сооружениях. В помёте 1 детёныш. Типичные представители – бурый (*P. auritus*), серый (*P. austriacus*) и сибирский (*P. ognevi*) ушаны. У. также называют представителей родственных и внешне сходных амер. родов: *Corynorhinus* (американские ушаны), *Idionycteris* (ушаны Аллена) и *Euderma* (пятнистые ушаны).