

ФЛАМИ́НГО

Авторы: Е. А. Коблик



Розовый фламинго.

Фото В.В. Климова

ФЛАМИ́НГО, фламинговые (Phoenicopteridae), семейство крупных околотовных птиц, вместе с ископаемыми группами составляющее отр. фламингообразных (Phoenicopteriformes). Известны с эоцена. Ранее их относили к отр. гусеобразных или аистообразных, ныне сближают с отр. поганкообразных. Длина 90–155 см, размах крыльев 95–165 см, масса 2–4,1 кг. Очень длинноногие и длинношеие. В оперении преобладают розовые и красные тона. Клюв короткий, толстый, изогнутый, с пластинами цедильного аппарата по краям челюстей. Передние пальцы соединены перепонкой. Хорошо плавают и летают. Голос похож на гусиный гогот. 3 рода, 6 видов. Очагами распространены в тропиках и субтропиках Зап. Евразии, Африки, Центр. и Юж. Америки. Строго общественные птицы, образуют скопления на щёлочно-солёных озёрах и в мелководных мор. лагунах, в Андах встречаются на выс. до 4500 м; места колоний и внегнездовых скоплений непостоянны, из умеренных широт (Казахстан,

Узбекистан) на зиму улетают. Питаются мелкими ракообразными и одноклеточными водорослями, процеживая воду. Нежные оттенки оперения обусловлены пигментами, получаемыми с кормом. Способны выносить большие перепады темп-ры, зависят от водного режима озёр и их химич. состава. Гнездятся колониями до миллиона пар, гнёзда – грязевые «столбики» на мелководьях или илистых островах. В кладке одно яйцо, птенец полувыводкового типа, первые недели родители выкармливают его калорийными выделениями пищевода и отрыжкой из рачков. Молодые Ф. сероватые, розовеют на 3–4-й год жизни; мн. птицы живут св. 20–30 лет. В Красную книгу РФ включён встречающийся на пролёте розовый Ф. (*Phoenicopterus roseus*). Два эндемика Анд включены в Красную книгу МСОП.