



# ХАЛЬМАХЁРСКО-ЧЕНДРАВАСИ́ХСКИЕ ЯЗЫКІ́

Авторы: Ю. Б. Коряков

ХАЛЬМАХЁРСКО-ЧЕНДРАВАСИ́ХСКИЕ ЯЗЫКІ́ (южнохальмахерско-западноновогвинейские языки), генетическое объединение внутри [австронезийских языков](#), входящее в вост. надветвь их малайско-полинезийской подсемьи. Распространены на севере Молуккских о-вов и по зап. побережью Новой Гвинеи (Индонезия). Общее число говорящих ок. 140 тыс. чел., в т. ч. на яз. биак 40 тыс. чел. (2016, оценка).

К Х.-ч. я. относятся 47 языков, которые делятся на 2 ветви – наби-ираруту (2 языка) и собственно хальмахерско-чендравасихскую. Последняя включает 3 подветви – бомберайскую (языки бедоанас, эрокванас, аргуни), чендравасихскую (см. [Чендравасихские языки](#) в 1-м значении), раджа-ампат-южнохальмахерскую, состоящую из групп амбель-бига [языки амбель (вайгео), бига], мая-матбатской [язык матбат, а также группа языков или диалектов мая (салавати, каве, легеньем, мая, вауяи, батанта)], южнохальмахерской (языки були, маба, патани, саваи, гане, таба, гебе), а также языков ас и фиават (маден), – и 3 отд. языка (моор, тандиа и варопен).

Часто в состав Х.-ч. я. включают распространённые ещё восточнее нижнемамберамские языки (варембори и йоке), в которых тесно переплетаются черты австронезийских и [папуасских языков](#).

## Литература

Лит.: Blust R. A. Eastern Malayo-Polynesian: a subgrouping argument // Second international conference on Austronesian linguistics: proceedings / Ed. by S. A. Wurm, Lois Carrington. 1978. Vol. 1; Kamholz D. South Halmahera – West New Guinea: The history of Oceanic's closest relative // Linguistic Society of America. Annual Meeting. Minneapolis, 2014.