



ЮЖНОАФРИКА́НСКАЯ РА́СА

Авторы: А. П. Пестряков



Фото Mario Micklish / flickr.com

Южноафриканская раса. Сан.

ЮЖНОАФРИКА́НСКАЯ РА́СА (бушменская раса, капоидная раса), малая раса в составе большой *негроидной расы*. От др. негроидов представители Ю. р. отличаются более светлым (жёлто-бурого оттенка) цветом кожи, более развитой курчавостью волос головы. Третичный волосяной покров слабо развит. При общей малой величине черепной коробки характерна её абсолютно и относительно низкая высота – в противоположность высокосводности большинства негроидов. Рост заметно ниже (за исключением *центральноафриканской расы*). Уплощённость лица и нередко выраженный эпикантус придают им псевдомонголоидный облик. Однако изгиб позвоночника в поясничном отделе (лордоз) обычно больше, чем у негроидов, в противоположность очень низкой величине этого признака у монголоидов. Нередко выражена стеатопигия (повышенное жиросложение на ягодицах), особенно у женщин.

Ю. р. представлена среди *койсанских народов* (*сан* и *кой-коин*), но в древности она была распространена значительно шире по Африке, о чём свидетельствуют наскальные рисунки в Сев. Африке, а также некоторые

краниологич. особенности совр. населения Вост. Африки.