



ШЕРСТЫСТЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ

Авторы: А. О. Аверьянов



Буря шерстистая обезьяна.

ШЕРСТЫСТЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ, лаготриксы (*Lagothrix*), род приматов сем. паукообразных обезьян (*Atelidae*). Включает 4 вида: серая шерстистая обезьяна (*L. cana*), колумбийская шерстистая обезьяна (*L. lugens*), буря шерстистая обезьяна (*L. lagotricha*) и серебристая шерстистая обезьяна (*L. roerppigii*). Распространены в высокогорных влажных тропич. лесах Юж. Америки. Длина тела 51–69 см, хвоста 60–72 см, масса 5,5–10,8 кг. Хвост хватательного типа, с обнажённой чувствит. поверхностью на нижней стороне. Окраска меха коричневая или серая. Голова и низ тела тёмные, бока и спина обычно более светлые. Живут группами по 40–45 особей. Питаются преим. плодами, реже листьями и мелкими животными. Беременность ок. 225 дней; обычно 1 детёныш. Половая зрелость наступает в 6–8 лет у самок и ок. 5 лет у самцов. В неволе живут до 24 лет.

Серая шерстистая обезьяна – вымирающий вид, колумбийская шерстистая обезьяна находится на грани исчезновения.