



БАНТОИДНЫЕ ЯЗЫКИ

Авторы: В. А. Виноградов

БАНТОИДНЫЕ ЯЗЫКИ́, совокупность родств. языков, образующих самую многочисл. ветвь в составе [бенуэ-конголезских языков](#) (по классификации Дж. Х. [Гринберга](#)). Распространены в странах Африки, южнее Сахары, – от Нигерии до Кении и к югу до ЮАР. Общее число говорящих на Б. я. порядка 350 млн. чел. (2004, оценка).

Термин «Б. я.» был предложен в 1895 нем. лингвистом В. Краузе. М. [Гасри](#) закрепил его в 1948 в своей классификации бантуских языков (см. [Банту языки](#)) вместо распространённого ранее термина «полубанту», введённого в 1919 англ. лингвистом Х. Х. Джонстоном. К Б. я. Гасри отнёс языки, которые обладают [классами именными](#), подобно бантуским языкам, но для которых не удаётся установить достаточных и регулярных лексич. соответствий с последними. В качестве обладающих такой характеристикой рассматривалась большая совокупность языков Зап. Африки, которую Д. А. [Ольдерогге](#) в 1960-х гг. предложил подразделять на вост.-бантоидные (бенуэ-конголезские языки, по Гринбергу), центр.-бантоидные ([гур языки](#), по Гринбергу) и зап.-бантоидные [зап.-атлант. языки, по Гринбергу (см. [Атлантические языки](#))].

Понятие «Б. я.» существенно изменило своё содержание после 1963, когда Дж. Х. Гринберг разработал окончат. вариант своей классификации афр. языков. С тех пор эта классификация постоянно уточняется и видоизменяется, особенно для бенуэ-конголезских языков, что отражается на положении Б. я. в генеалогич. схеме. В нач. 21 в. в составе Б. я. (охватывающих более 600 языков, в т. ч. малоизученных) наиболее чётким положением на правах самой многочисл. группы характеризуются языки банту. Также выделяют множество групп и подгрупп Б. я. (гл. обр. на территории Камеруна и Нигерии), границы между которыми остаются предметом дискуссий. Считается, что особую подветвь образуют языки тикар, мамбила, дака и ряд близкородственных языков; выделяются также джаравские языки (бада, джарава, बारे, мбоа и др.), экойдные языки (ндо, этунг, кеака, обанг, нде), многочисл. группа грассфилдских (грасслэндских) языков, распространённых в зоне центр.-камерунских саванн (бамум, бамилеке, подгруппа нгемба, ком, ндоп и др.). Согласно последним классификациям, предлагается объединять Б. я. в две большие группы – северную и южную.

Для фонетики Б. я. характерно разнообразие звуковых типов, [вокализм](#) содержит классы гласных среднего ряда, для гласных важную роль играет категория продвинутости-отодвинутости корня языка; согласные характеризуются наличием сложных артикуляц. типов; в структуре слога избегаются сочетания согласных; большинство Б. я. имеет [тон](#). Специфика грамматики определяется наличием именных классов, наилучшим образом сохраняющихся в языках банту, но в разной степени разрушенных в др. языках по мере продвижения от Вост. Африки к Западной; развиты глагольные категории, выражаемые многочисл. формантами; [порядок слов](#) в простом предложении: «субъект+глагол+объект». В типологич. отношении в целом Б. я. неоднородны; если в языках банту представлена [агглютинация](#) с элементами [флективности](#), то в зап. ареале Б. я. морфологич. система менее развита и преобладает [изоляция](#).

Многие Б. я. бесписьменны; в тех случаях, когда письменность создана, она опирается на лат. основу.

Изучение Б. я. началось с исследования языков банту в 17 в. В настоящее время они активно изучаются в африканистич. центрах России (Москва, С.-Петербург), Европы (Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания), США, афр. стран (Нигерия, Камерун, Танзания, Кения, ЮАР и др.).

Литература

Лит.: Die Sprachen Afrikas. Hamb., 1981; Watters J. R. Bantoid overview // The Niger-Congo languages. Lanham, 1989; Williamson K., Blench R. Niger-Congo // African languages: an introduction. Camb., 2000.